

外科42 FOLFIRI+P-mab

☆適応疾患名: 結腸直腸がん

1クール

薬剤	標準投与量	投与経路	投与スケジュール	
			1week	2week
ベクティビックス (P-mab)	6mg/kg	点滴静注	day1	
レボホリナート (I-LV)	200mg/m ²	点滴静注	day1	
フルオロウラシル (5-FU)	2400mg/m ²	持続静注	day1,2	
フルオロウラシル (5-FU)	400mg/m ²	静注(全開)	day1	
イリノテカン (CPT-11)	150mg/m ²	点滴静注	day1	

ベクティビックス(パニツムマブ): ベクティビックス点滴静注 100mg,
 レボホリナート(レボホリナート): レボホリナート点滴静注用25mg, 100mg「ヤクルト」
 フルオロウラシル(フルオロウラシル): フルオロウラシル注 250mg, 1000mg「トローワ」
 イリノテカン(イリノテカン塩酸塩): イリノテカン塩酸塩点滴静注液「タイホウ」40mg, 100mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ベクティビックス	●													
レボホリナート	●													
フルオロウラシル<持続静注>	●	●												
フルオロウラシル<全開>	●													
イリノテカン	●													

		CVポートより
		ルートキープ用 生食 100mL 使用可
第1日目	全開	グラニセトロン点滴静注液3mg/100mL デキサート注射液6.6mg 1V
	1時間	ベクティビックス 6mg/kg 生理食塩液 100mL
	5分	ルートキープ用生理食塩液 100mL
	2時間 ↑1.5時間 (イリノテカン)	レボホリナート 200mg/m ² 5%ブドウ糖注 250mL
	全開	フルオロウラシル 400mg/m ² 生理食塩液 50mL
第2日目	46時間	フルオロウラシル 2400mg/m ² (生食で希釈) インフューザー使用 (2mL/h)

イリノテカン 150mg/m²
 5%ブドウ糖注 250mL
 (側管)

H22.12.21 作成

H26.9.10 改訂

H27.9.29 改訂