

外科45 XP+HER

☆適応疾患名: 胃がん

| 薬剤 | 標準投与量 | 投与経路 | 投与スケジュール | | |
|-----------------|-------------------------------|------|-----------|------------|-------|
| | | | 1week | 2week | 3week |
| ハーセプチン (HER) | 《初回》 8mg/kg 《2回目以降》 6mg/kg | 点滴静注 | day1 | | |
| シスプラチン (CDDP) | 80mg/m ² | 点滴静注 | day1 | | |
| ゼローダ (XEL) | 1000mg/m ² /回 | 内服 | day1~day7 | day8~day14 | |

← 1クール →

← 休薬期間 →

*投与対象: IHC法でHER2(3+),もしくはIHC法でHER2(2+),FISH法でHER2(+)
初回投与前は必ず心エコーを行い、心機能を評価すること

ハーセプチン(トラスツズマブ) : ハーセプチン注射用60mg,150mg
シスプラチン(シスプラチン) : シスプラチン点滴静注 10mg, 50mg
ゼローダ(カペシタビン) : ゼローダ錠 300mg

| | day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| ハーセプチン | ● | | | | | | | | | | | | | |
| シスプラチン | ● | | | | | | | | | | | | | |
| ゼローダ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|--|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | 本管 |
|-------|--|
| 4時間以上 | ソルラクト 1000mL |
| 90分 | 生理食塩液 500mL |
| 90分 | ハーセプチン《初回》 8mg/kg 《2回目以降》 6mg/kg 生理食塩液 250mL |
| 30分 | グラニセロン点滴静注液3mg100mL デキサート注射液6.6mg 2V |
| 30分 | 20%マンニトール 300mL |
| 3時間 | シスプラチン 80mg/m ² 生理食塩液 1000mL |
| 30分 | 20%マンニトール 300mL |
| 4時間以上 | ソルラクト 1000mL |
| | ゼローダは夕食後から内服開始 |

H23.10.31 作成
H25.3.4 改訂
H27.9.29 改訂
H28.9.21 改訂