

血液内科47 RICE

☆適応疾患名:非ホジキンリンパ腫

← 1クール →

薬剤	標準投与量	投与法	投与スケジュール	
			1week	2week
リツキサン (RIT)	375mg/m ²	点滴静注	day1	
カルボプラチン (CBDCA)	AUC=5(max:800mg)	点滴静注	day3	
エトポシド (VP-16)	100mg/m ²	点滴静注	day2-4	
イホマイド (IFO)	5000mg/m ²	持続点滴	day3	
ウロミテキサン (mesuna)	5000mg/m ²	持続点滴	day3	

← 休薬期間 →

リツキサン(リツキシマブ):リツキサン100mg, 500mg
 カルボプラチン(カルボプラチン):カルボプラチン150mg
 エトポシド(エトポシド):エトポシド100mg
 イホマイド(イホスファミド):イホマイド1g
 ウロミテキサン(メスナ):ウロミテキサン100mg, 400mg

<参考> CBDCA投与量(mg/body)=目標AUC値×(GFR+25) [Calvertの式]
 GFR=Ccr×体表面積/1.73

プレメディケーション:リツキサン投与30分前に解熱鎮痛薬(ロキソプロフェン等),
 抗ヒスタミン薬(ポララミン等)を内服

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
リツキサン	●													
カルボプラチン			●											
ラステット		●	●	●										
イホマイド			●											
ウロミテキサン			●											

【1日目】

	本管	側管
30分	生理食塩液 100mL	
1時間		リツキサン375mg/m ² 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度25ml/h)
1時間		(投与速度100ml/h)
最後まで		(投与速度200ml/h)

ロキソプロフェン錠 1T } 内服
 ポララミン錠 1T }

【1日目（リツキサン2回目以降は下記に変更可能）】

※リツキサン初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合に変更可能

	本管	側管
30分	生理食塩液 100mL	
30分		リツキサン375mg/m ² 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度100mL/h)
30分		(投与速度200mL/h)
30分		(投与速度300mL/h)
最後まで		(投与速度400mL/h)

ロキソプロフェン錠1T } 内服
 ポララミン錠 1T }

【2日目、4日目】

グラニセトン点滴静注液3mg	30分
エトポシド 100mg/m ² 生理食塩液500mL	2時間

※4日目はイホマイド+ウロミテキサン終了後

【3日目】

グラニセトン点滴静注液3mg	30分
カルボプラチン AUC=5 生理食塩液250mL	1時間
エトポシド 100mg/m ² 生理食塩液500mL	2時間
イホマイド 5000mg/m ² ウロミテキサン 5000mg/m ² 生理食塩液1000mL	24時間

※イホマイド濃度:0.6-20mg/mL

ウロミテキサン濃度:20mg/mLを超えない