


血液内科48 ジフォルタ

☆適応疾患名:末梢性T細胞リンパ腫



薬剤	標準投与量	投与法	投与スケジュール						
			1week	2week	3week	4week	5week	6week	7week
ジフォルタ	30mg/m ²	点滴静注	day1	day8	day15	day22	day29	day36	

ジフォルタ(プララトレキサート):ジフォルタ注射液20mg【血管外漏出時の組織侵襲:非炎症性薬剤】

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ジフォルタ	●							●						
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	●							●						
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	●							●						
	43	44	45	46	47	48	49							



★口内炎予防のためにクライオセラピー(氷なめ)を行う
[ジフォルタ投与開始 30 分前から終了後 30 分後まで]

●葉酸補充

ジフォルタ投与日の 10 日以上前からフォリアミン錠 0.2 錠~0.25 錠を連日服用
ジフォルタ終了日から 30 日後まで継続

●ビタミン B12 補充

ジフォルタ投与日の 10 日以上前からメコバラミン注 500 μg 2A を 8~10 週ごとに筋注
ジフォルタ投与中は補充を継続