

外科49 5-FU+MMC

☆適応疾患名: 肛門管がん

← 1クール →

| 薬剤 | 標準投与量 | 投与法 | 投与スケジュール | | | |
|----------------|-----------------------|------|----------|-------|-------|-------|
| | | | 1week | 2week | 3week | 4week |
| フルオロウラシル(5-FU) | 1000mg/m ² | 持続静注 | day1~4 | / | / | / |
| マイトマイシン (MMC) | 10mg/m ² | 点滴静注 | day1 | / | / | / |

← 休薬期間 →

フルオロウラシル(フルオロウラシル): フルオロウラシル注 250mg, 1000mg「トーワ」
 マイトマイシン(マイトマイシンC): マイトマイシン注 2mg

| | day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| フルオロウラシル | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| マイトマイシン | ● | | | | | | | | | | | | | |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | |

【1日目】

| | |
|------|--|
| | 生理食塩液 100mL (ルートキープ 初日のみ) |
| 全開 | グラニセトン点滴静注液3mg 100mL デキサート注射液6.6mg 1V |
| 30分 | ルートキープ用生理食塩液100mL |
| 全開 | マイトマイシン 10mg/m² 生理食塩液 50mL |
| 5分 | ルートキープ用生理食塩液100mL |
| 24時間 | フルオロウラシル 1000mg/m² 生理食塩液 1000mL |

【2~4日目】

| | |
|------|---|
| 24時間 | フルオロウラシル1000mg/m² 生理食塩液 1000mL |
|------|---|