

血液内科 49 D-CEP

☆適応疾患名:多発性骨髄腫

1コース

薬剤	標準投与量	投与法	投与スケジュール		
			1week	2week	3week
エトポシド (VP-16)	40mg/m ²	持続点滴	day1-4		
シスプラチン (GDDP)	10mg/m ²	持続点滴	day1-4		
エンドキサン (CPA)	400mg/m ²	持続点滴	day1-4		
デキサート (DEX)	33mg/m ²	点滴	day1-4		

休薬期間

エトポシド(エトポシド): エトポシド100mg
 シスプラチン(シスプラチン): シスプラチン10mg, 50mg
 エンドキサン(シクロホスファミド): エンドキサン100mg, 500mg
 デキサート(デキサメタゾン): デキサート6.6mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
エトポシド	●	●	●	●										
シスプラチン	●	●	●	●										
エンドキサン	●	●	●	●										
デキサート	●	●	●	●										

15	16	17	18	19	20	21

【1~4日目】

30分	デキサート33mg 生理食塩液 100mL
24時間	エトポシド 40mg/m² シスプラチン 10mg/m² エンドキサン 400mg/m² 生理食塩液 1000mL

☆制吐剤は 5-HT3 受容体拮抗薬を推奨
 ☆シスプラチンが長時間にわたる投与の場合は光による分解の可能性があるので遮光して投与
 (光によりシスプラチンが分解される)

※2~4日目は 24 時間持続点滴の側管からデキサートを点滴