

外科50 アブラキサン

☆適応疾患名: 胃がん・乳がん

| | | | 1クール | | |
|------------------|----------------------|------|----------|-------|-------|
| | | | 投与スケジュール | | |
| 薬剤 | 標準投与量 | 投与経路 | 1week | 2week | 3week |
| アブラキサン (nab-PTX) | 260mg/m ² | 点滴静注 | day1 | | |

休薬期間

アブラキサン(パクリタキセル【アルブミン懸濁型】) : アブラキサン100mg

| | day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| アブラキサン | ● | | | | | | | | | | | | | |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | |

| | |
|-----|--|
| | ルートキープ用 生食100mL 使用可 |
| 全開 | グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL デキサート注射液6.6mg 1V |
| 30分 | ルートキープ用 生食100mL |
| 30分 | アブラキサン 260mg/m ² 生理食塩液 100mL |