

# 血液内科53 CHOEP

☆適応疾患名:T細胞リンパ腫

				1コース		
				投与スケジュール		
薬剤	標準投与量	投与方法	1week	2week	3week	
エンドキサン (CPA)	750mg/m <sup>2</sup>	点滴	day1			
ドキシソルビシン (DXR)	50mg/m <sup>2</sup>	点滴	day1			
オンコビン (VCR)	1.4mg/m <sup>2</sup>	点滴	day1			
エトポシド (VP-16)	100mg/m <sup>2</sup>	点滴	day1-3			
プレドニン (PSL)	100mg/body	内服	day1-5			

← 休薬期間 →

エンドキサン(シクロホスファミド): エンドキサン100mg, 500mg  
 ドキシソルビシン (ドキシソルビシン): ドキシソルビシン10mg, 50mg  
 オンコビン (ビンクリスチン): オンコビン1mg  
 エトポシド(エトポシド): エトポシド100mg  
 プレドニン(プレドニゾロン): プレドニン錠5mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
エンドキサン	●													
ドキシソルビシン	●													
オンコビン	●													
エトポシド	●	●	●											
プレドニン	●	●	●	●	●									

15	16	17	18	19	20	21

## 【1日目】

10分	↑ ↓	オンコビン1.4mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液50mL
1時間	↑ ↓	ドキソルビシン 50mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖液100mL
2時間	↑ ↓	エトポシド 100mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液500mL
2時間	↑ ↓	エンドキサン 750mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液500mL

カイトリルまたはグラニセトロン  
を前投薬で使用

## 【2、3日目】

2時間	↑ ↓	エトポシド 100mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液500mL
-----	--------	------------------------------------------

カイトリルまたはグラニセトロン  
を前投薬で使用