

# 外科53 FOLFIRINOX

☆適応疾患名: 膵がん

1クール

薬剤	標準投与量	投与経路	投与スケジュール	
			1week	2week
レボホリナート (L-LV)	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
フルオロウラシル (5-FU)	2400mg/m <sup>2</sup>	持続静注	day1,2	
フルオロウラシル (5-FU)	400mg/m <sup>2</sup>	静注(全開)	day1	
オキサリプラチン (L-OHP)	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
イリノテカン (CPT-11)	180mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	

休薬期間

レボホリナート(レボホリナート):レボホリナート点滴静注用25mg, 100mg「ヤクルト」  
 フルオロウラシル(フルオロウラシル):フルオロウラシル注 250mg, 1000mg「トーフ」  
 オキサリプラチン(オキサリプラチン):オキサリプラチン点滴静注液50mg, 100mg「ホスピーラ」  
 イリノテカン(イリノテカン塩酸塩):イリノテカン塩酸塩点滴静注液「タイホウ」40mg, 100mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
レボホリナート	●													
フルオロウラシル<持続静注>	●	●												
フルオロウラシル<全開>	●													
オキサリプラチン	●													
イリノテカン	●													

		CVポートより		
		ルートキープ用 生食 100mL 使用可		
第1日目	全開	グラニセトロン点滴静注液3mg100mL デキサート注射液6.6mg 2V		
	30分	ルートキープ用 生食 100mL		
	2時間	<b>オキサリプラチン 85mg/m<sup>2</sup></b> 5%ブドウ糖注 250mL		
	2時間	1.5時間 (イリノテカン)	<b>レボホリナート 200mg/m<sup>2</sup></b> 5%ブドウ糖注 250mL	<b>イリノテカン 180mg/m<sup>2</sup></b> 5%ブドウ糖注 250mL <b>(側管)</b>
	全開			
	第2日目	46時間	<b>フルオロウラシル 2400mg/m<sup>2</sup></b> (生食で希釈) インフューザー使用 (2mL/h)	

※制吐剤はイメンド併用が望ましい(併用の場合、デキサートは1.5V)