

# 外科54 パーージェタ+トラスツズマブ+DTX

☆適応疾患名:乳がん

1クール

薬剤	標準投与量	投与法	投与スケジュール		
			1week	2week	3week
パーージェタ (Pertuzumab)	《初回》 840mg 《2回目以降》 420mg	点滴静注	day1		
トラスツズマブ (Trastuzumab)	《初回》 8mg/kg 《2回目以降》 6mg/kg	点滴静注	day1		
ドセタキセル (DTX)	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1		

\*投与対象: IHC法でHER2(3+),もしくはIHC法でHER2(2+),FISH法でHER2(+)

初回投与前は必ず心エコーを行い、心機能进行评估すること  
 初回投与時は入院にて行うこと  
 初回投与時はパーージェタとトラスツズマブを同日に投与しないことが望ましい

パーージェタ(ペルツズマブ): パーージェタ点滴静注420mg  
 トラスツズマブ(トラスツズマブ): トラスツズマブBS点滴注射用60mg,150mg  
 ドセタキセル(ドセタキセル): ドセタキセル点滴静注用20mg, 80mg「ニプロ」

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
パーージェタ	●													
トラスツズマブ	●													
ドセタキセル	●													

15	16	17	18	19	20	21

※	ルートキープ用 生食 100mL 使用可
60分	<b>パーージェタ</b> 《初回》840mg 《2回目以降》420mg 生理食塩液      250mL
※	<b>トラスツズマブ</b> 《初回》8mg/kg 《2回目以降》6mg/kg 生理食塩液      250mL
全開	グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL デキサート注射液 6.6mg 1V
30分	ルートキープ用 生食 100mL
60分	<b>ドセタキセル</b> 75mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液      250mL

※初回投与の忍容性が良好であれば、  
2回目以降の投与時間は30分まで短縮可能