

# 外科55 AC followed by PTX(weekly)+ハーセプチン(tri-weekly)

☆適応疾患名:乳がん術前補助化学療法

← 1クール →

投与スケジュール								
薬剤	標準投与量	投与法	1week	2week	3week	4week	5week	6week
エンドキサン(CPA)	600mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1			day22		
ドキソルビシン(DXR)	60mg/m <sup>2</sup>	静脈注射	day1			day22		

← 休薬期間 →

投与スケジュール						
投与法	7week	8week	9week	10week	11week	12week
点滴静注	day43			day64		
静脈注射	day43			day64		

AC療法4クール終了後

投与スケジュール								
薬剤	標準投与量	投与法	1week	2week	3week	4week	5week	6week
ハーセプチン (HER)	《初回》 8mg/kg 《2回目以降》 6mg/kg	点滴静注	day1			day22		
パクリタキセル(PTX)	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	day8	day15	day22	day29	day36

	7week	8week	9week	10week	11week	12week
day43				day64		
day43	day50	day57	day64	day71	day78	

エンドキサン(シクロホスファミド): エンドキサン 100mg, 500mg

ドキソルビシン(ドキソルビシン): ドキソルビシン 10mg

ハーセプチン(トラスツズマブ): ハーセプチン注射用60mg,150mg

パクリタキセル: パクリタキセル注 30mg, 100mg

\*投与対象:IHC法でHER2(3+),もしくはIHC法でHER2(2+),FISH法でHER2(+)

初回投与前は必ず心エコーを行い、心機能を評価すること  
 初回投与時は入院にて行うこと  
 初回投与時はハーセプチンとパクリタキセルを同日に投与しないことが望ましい

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
エンドキサン	●																				
ドキソルビシン	●																				
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	●																				
	●																				
	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
	●																				
	●																				
	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
	●																				
	●																				

AC療法4クール終了後

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ハーセプチン	●																				
パクリタキセル	●							●							●						
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	●																				
	●							●							●						
	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
	●																				
	●							●							●						
	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
	●																				
	●							●							●						

【AC療法 day1.22.43.64】

	ルートキープ用 生食 100mL 使用可
全開	グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL デキサート注射液6.6mg 2V
30分	ルートキープ用 生食 100mL
全開	ドキソルビシン 60mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 50mL
60分	エンドキサン 600mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 500mL

【PTX+ハーセプチン day1.22.43.64】

	ルートキープ用 生食 100mL 使用可	
90分	ハーセプチン 《初回》8mg/kg 《2回目以降》6mg/kg 生理食塩液 250mL	
全開	グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL デキサート注射液 6.6mg 1V ガスター注射液 20mg 1A	レスタミンコーワ錠 5T 内服
30分	ルートキープ用 生食 100mL	
60分	パクリタキセル注 80mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 250mL	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> <p>《注意》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・初回はモニター装着</li> <li>・パクリタキセルは最初の10分はゆっくり投与</li> </ul> </div>

【PTX+ハーセプチン day8.15.29.36.50.57.71.78】

