

## 血液内科55 R-GCVP

☆適応疾患名：非ホジキンリンパ腫

← 1クール →

薬剤	標準投与量	投与法	投与スケジュール		
			1week	2week	3week
リツキシマブ (RIT)	375mg/m <sup>2</sup>	点滴	day1	/	/
エンドキサン (CPA)	750mg/m <sup>2</sup>	点滴	day2	/	/
ゲムシタビン (GEM)	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	day2	day9	/
オンコビン (VCR)	1.4mg/m <sup>2</sup>	点滴	day2	/	/
プレドニン (PSL)	100mg/body	内服	day2-6	/	/

← 休薬期間 →

リツキシマブ(リツキシマブ)：リツキシマブBS点滴静注100mg, 500mg  
 エンドキサン(シクロホスファミド)：エンドキサン100mg, 500mg  
 ゲムシタビン(ゲムシタビン)：ゲムシタビン点滴静注200mg, 1000mg  
 オンコビン(ビクリスチン)：オンコビン1mg  
 プレドニン(プレドニゾロン)：プレドニン錠5mg

プレメディケーション：リツキシマブ投与30分前に解熱鎮痛薬(ロキソプロフェン等),  
 抗ヒスタミン薬(ポララミン等)を内服  
 エンドキサン使用日はカイトリル錠を併用

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
リツキシマブ	●													
エンドキサン		●												
ゲムシタビン		●							●					
オンコビン		●												
プレドニン		●	●	●	●	●								

15	16	17	18	19	20	21

【1日目リツキシマブ初回】

	本管	側管
30分	生理食塩液 100mL	
1時間		リツキシマブ375mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度25ml/h)
1時間		(投与速度100ml/h)
最後まで		(投与速度200ml/h)

ロキソプロフェン錠 1T } 内服  
 ポララミン錠 1T

【1日目（リツキシマブ2回目以降は下記に変更可能）】

	本管	側管
30分	生理食塩液 100mL	
30分		リツキシマブ375mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度100mL/h)
30分		(投与速度200mL/h)
30分		(投与速度300mL/h)
最後まで		(投与速度400mL/h)

ロキソプロフェン錠 1T } 内服  
 ポララミン錠 1T

※リツキシマブ初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合に変更可能

## 【2日目】

	ルートキープ用 生食100mL 使用可
全開	オンコビン 1.4mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 50mL
2時間	エンドキサン 750mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 500mL
30分	ゲムシタビン 1000mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 100mL

※吐気止めはカイトリル併用

## 【9日目】

	ルートキープ用 生食100mL 使用可
全開	グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL デキサート注射液6.6mg 1V
30分	ルートキープ用 生食100mL
30分	ゲムシタビン 1000mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 100mL