

## 血液内科57 G-THP-COP

☆適応疾患名:非ホジキンリンパ腫

### 【1コース目】

			1コース		
			投与スケジュール		
薬剤	標準投与量	投与法	1week	2week	3week
ガザイバ	1000mg/body	点滴	day1	day8	day15
エンドキサン (CPA)	750mg/m <sup>2</sup>	点滴	day2		
ピノルビン (THP)	50mg/m <sup>2</sup>	点滴	day2		
オンコビン (VCR)	1.4mg/m <sup>2</sup>	静注	day2		
プレドニン (PSL)	100mg/body	内服	day2-6		

### 【2～6コース目】

			1コース		
			投与スケジュール		
薬剤	標準投与量	投与法	1week	2week	3week
ガザイバ	1000mg/body	点滴	day1		
エンドキサン (CPA)	750mg/m <sup>2</sup>	点滴	day2		
ピノルビン (THP)	50mg/m <sup>2</sup>	点滴	day2		
オンコビン (VCR)	1.4mg/m <sup>2</sup>	静注	day2		
プレドニン (PSL)	100mg/body	内服	day2-6		

休薬期間

### 【7、8コース目】

			1コース		
			投与スケジュール		
薬剤	標準投与量	投与法	1week	2week	3week
ガザイバ	1000mg/body	点滴	day1		

休薬期間

ガザイバ (オビヌツズマブ) : ガザイバ1000mg  
 エンドキサン (シクロホスファミド) : エンドキサン100mg, 500mg  
 ピノルビン (ピラルビシン) : ピノルビン10mg、ピノルビン30mg  
 オンコビン (ピンクリスチン) : オンコビン1mg  
 プレドニン (プレドニゾロン) : プレドニン錠5mg

プレメディケーション: ガザイバ投与30分前に解熱鎮痛薬 (ロキソプロフェン等),  
 抗ヒスタミン薬 (レスタミン等) を内服

R2.6.12 作成  
 R4.9.29 改訂  
 R6.7.18 改訂

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ガザイバ	●							※(●)						
エンドキサン		●												
ピノルビン		●												
オンコピン		●												
プレドニン		●	●	●	●	●								

15	16	17	18	19	20	21
※(●)						

※1コース目のみ投与  
7、8コース目はガザイバのみ3週間毎

### 【1コース目、1日目】

	本管	側管	
30分	生理食塩液 100mL	デキサート6.6mg 2.5V 生食100mL	ロキソプロフェン錠 1T レスタミン錠 5T } 内服
30分		ガザイバ1000mg/body 生理食塩液 250mL (投与速度12.5ml/h)	
30分		(投与速度25ml/h)	生食100mL+デキサート16.5mg 30分かけて投与 (ガザイバ投与30分前より)
30分		(投与速度37.5ml/h)	
30分		(投与速度50ml/h)	
30分		(投与速度62.5ml/h)	
30分		(投与速度75ml/h)	
30分		(投与速度87.5ml/h)	
最後まで		(投与速度100ml/h)	

ガザイバは必ずフィルター  
(0.2μm、0.22μm)を通すこと

R2.6.12 作成  
R4.9.29 改訂  
R6.7.18 改訂

【1コース目、2日目】

	本管	側管
全開	オンコピン 1.4mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 50mL	
2時間	エンドキサン 750mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 500mL  カイトリル 1T内服	ピノルビン 50mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖液 100mL

↑ 30分 ↓

【1コース目、8日目、15日目】

当該投与日の前回の投与で Grade3 以上の infusion reaction が発現しなかった場合

	本管	側管
30分	生理食塩液 100mL	
30分		ガザイバ1000mg/body 生理食塩液 250mL (投与速度25ml/h)
30分		(投与速度50ml/h)
30分		(投与速度75ml/h)
最後まで		(投与速度100ml/h)

ロキソプロフェン錠 1T } 内服  
 レスタミン錠 5T }

ガザイバは必ずフィルター  
 (0.2 μ m、0.22 μ m) を通すこと

R2.6.12 作成  
R4.9.29 改訂  
R6.7.18 改訂

【2～6コース目、1日目】

当該投与日の前回の投与で Grade3 以上の infusion reaction が発現しなかった場合

	本管	側管	
30分	生理食塩液 100mL		ロキソプロフェン錠 1T } 内服 レスタミン錠 5T
30分		ガザイバ1000mg/body 生理食塩液 250mL (投与速度25ml/h)	
30分		(投与速度50ml/h)	
30分		(投与速度75ml/h)	
最後まで		(投与速度100ml/h)	ガザイバは必ずフィルター (0.2 μ m、0.22 μ m) を通すこと

【2～6コース目、2日目】

	本管	側管	
全開	オンコピン 1.4mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 50mL		
2時間	エンドキサン 750mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 500mL	ピノルビン 50mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖液 100mL	30分
	カイトリル 1T内服		

R2.6.12 作成  
R4.9.29 改訂  
R6.7.18 改訂

【7、8コース目】

当該投与日の前回の投与で Grade3 以上の infusion reaction が発現しなかった場合

	本管	側管	
30分	生理食塩液 100mL		ロキソプロフェン錠 1T } 内服 レスタミン錠 5T }
30分		ガザイバ1000mg/body 生理食塩液 250mL (投与速度25ml/h)	
30分		(投与速度50ml/h)	
30分		(投与速度75ml/h)	
最後まで		(投与速度100ml/h)	ガザイバは必ずフィルター (0.2 μ m、0.22 μ m) を通すこと