

外科57 XELOX(胃がん)

☆適応疾患名:胃がん

			1クール		
			投与スケジュール		
薬剤	標準投与量	投与経路	1week	2week	3week
オキサリプラチン(L-OHP)	※130mg/m ²	点滴静注	day1		
ゼローダ (XEL)	1200~2100mg/回	内服	day1~day14		

← 休薬期間 →

オキサリプラチン(オキサリプラチン):オキサリプラチン点滴静注液50mg 100mg「ホスピーラ」
 ゼローダ(カペシタビン):ゼローダ錠 300mg ※エルプラットの量はSOX(胃がん)同様
 100mg/m²としてもよい。

ゼローダ投与量

体表面積	投与量(1日量)
1.36m ² 未満	2400mg
1.36m ² 以上1.66m ² 未満	3000mg
1.66m ² 以上1.96m ² 未満	3600mg
1.96m ² 以上	4200mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オキサリプラチン	●													
ゼローダ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

15	16	17	18	19	20	21

全開	ルートキープ用 生食 100mL 使用可
	グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL デキサート注射液6.6mg 1V
30分	ルートキープ用 生食 100mL
2時間	オキサリプラチン 130mg/m ² ※ 5%ブドウ糖注 500mL
	ゼローダは夕食後から内服開始