

血液内科59 VPd

☆適応疾患名: 多発性骨髄腫
1コース

【1～8コース】

薬剤	標準投与量	投与法	投与スケジュール		
			1week	2week	3week
ベルケイド	1.3mg/m ²	皮下注射	day1,4	day8,11	
ポマリスト	4mg/body	内服(寝る前)	day1-14		
レナデックス	20mg/body	内服(朝食後)	day1,2,4,5	day8,9,11,12	

【9コース目以降】

薬剤	標準投与量	投与法	投与スケジュール		
			1week	2week	3week
ベルケイド	1.3mg/m ²	皮下注射	day1	day8	
ポマリスト	4mg/body	内服(寝る前)	day1-14		
レナデックス	20mg/body	内服(朝食後)	day1,2	day8,9	

ベルケイド(ボルテゾミブ): ベルケイド3mg

ポマリスト(ポマリトミド): ポマリスト4mg、ポマリスト3mg、ポマリスト2mg、ポマリスト1mg

【1～8コース】


	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ベルケイド	●			●				●			●			
ポマリスト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
レナデックス	●	●		●	●			●	●		●	●		●
	15	16	17	18	19	20	21							

【9コース目以降】

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ベルケイド	●							●						
ポマリスト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
レナデックス	●	●						●	●					
	15	16	17	18	19	20	21							

ベルケイド 3mg 1.3mg/m²

生理食塩液 20mL 1A



皮下注射

※生理食塩液 1.5mL で溶解し必要量を抜き取る