

外科60 RAM+PTX

☆適応疾患名: 胃がん

← 1コース →

薬剤	標準投与量	投与方法	投与スケジュール			
			1week	2week	3week	4week
パクリタキセル (PTX)	80mg/m ²	点滴静注	day1	day8	day15	
サイラムザ (RAM)	8mg/kg	点滴静注	day1		day15	

← 休薬期間 →

パクリタキセル(パクリタキセル): パクリタキセル注 30mg, 100mg

サイラムザ(ラムシルマブ): サイラムザ 100mg, 500mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
パクリタキセル	●							●						
サイラムザ	●													

	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	●													
	●													

全開	ルートキープ用 生食100mL 使用可 グラニセトロン点滴静注液3mg100mL デキサート注射液 6.6mg 1V ガスター注射液 20mg 1A
5分	ルートキープ用 生食100mL
60分	サイラムザ※ 8mg/kg 生理食塩液 250mL
60分	ルートキープ用 生食100mL(経過観察期間)
60分	パクリタキセル 80mg/m ² 生理食塩液 250mL

※初回はモニター装着を推奨

レスタミンコーワ錠 5T 内服

※テルフュージョンファイナルフィルターPS
シュアプラグ(SP-PD36P03Y)
上記フィルター(0.2μm)を使用

最初の2コースは必須。infusion
reactionの発現がなければ
3コース以降は省略可

《注意:パクリタキセル》
・始めの10分はゆっくり投与