

外科62 IRIS+ベクティビックス

☆適応疾患名: 結腸直腸がん

薬剤	標準投与量	投与経路	1クール			
			1week	2week	3week	4week
ベクティビックス (Pmab)	6mg/kg	点滴静注	day1		day15	
イリノテカン (CPT-11)	100mg/m ²	点滴静注	day1		day15	
エスワン (S1)	80~120mg/body	内服	day1~day7	day8~day14		

休薬期間

ベクティビックス(パニツムマブ): ベクティビックス点滴静注 100mg
 イリノテカン(イリノテカン): イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg, 100mg
 エスワン(テガフル, ギメラシル, オテラシルカリウム): エスワンOD錠T 20, 25

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ベクティビックス	●													
イリノテカン	●													
エスワン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	15	16	17	18	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ベクティビックス	●													
イリノテカン	●													
エスワン														

S1投与量

体表面積	投与量(1日分)
1.25m ² 未満	80mg
1.25m ² 以上~1.5m ² 未満	100mg
1.5m ² 以上	120mg

