

外科63 TC+H

☆適応疾患名:乳がん術後補助化学療法

			1クール		
			投与スケジュール		
薬剤	標準投与量	投与法	1week	2week	3week
ハーセプチン (Trastuzumab)	《初回》 8mg/kg 《2回目以降》 6mg/kg	点滴静注	day1		
エンドキサン (CPA)	600mg/m ²	点滴静注	day1		
ドセタキセル (DTX)	75mg/m ²	点滴静注	day1		

休薬期間

ハーセプチン(トラツズマブ):ハーセプチン注射用60mg, 150mg
 エンドキサン(シクロホスファミド): エンドキサン 100mg, 500mg
 ドセタキセル(ドセタキセル):ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 20mg, 80mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ハーセプチン	●													
エンドキサン	●													
ドセタキセル	●													

15	16	17	18	19	20	21

	ルートキープ用 生食 100mL 使用可
全開	グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL デキサート注射液6.6mg 1V
90分	ハーセプチン《初回》 8mg/kg 《2回目以降》 6mg/kg 生理食塩液 250mL
5分	ルートキープ用 生食 100mL
1時間	ドセタキセル 75mg/m ² 生理食塩液 250mL
5分	ルートキープ用 生食 100mL
2時間	エンドキサン 600mg/m ² 生理食塩液 500mL