

血液内科64 IsaPd

☆適応疾患名: 多発性骨髄腫

1コース

【1コース目】

薬剤	標準投与量	投与方法	投与スケジュール			
			1week	2week	3week	4week
サークリサ	10mg/kg	点滴静注	day1	day8	day15	day22
ポマリスト	4mg/body	内服	day1~21			
デキサート	※33mg/body (75歳以上は16.5mg)	点滴静注	day1	day8	day15	day22

※レナデックス(内服)の場合は40mg/body(75歳以上は20mg)

【2コース目以降】

薬剤	標準投与量	投与方法	投与スケジュール			
			1week	2week	3week	4week
サークリサ	10mg/kg	点滴静注	day1		day15	
ポマリスト	4mg/body	内服	day1~21			
デキサート	※33mg/body (75歳以上は16.5mg)	点滴静注	day1	day8	day15	day22

※レナデックス(内服)の場合は40mg/body(75歳以上は20mg)

サークリサ(イサツキシマブ): サークリサ点滴静注100mg, 500mg

【血管外漏出時の組織侵襲: 非炎症性薬剤】

ポマリスト(ポマリドミド): ポマリストカプセル1, 2, 3, 4mg

デキサート or レナデックス(デキサメタゾン): デキサート注射液6.6mg or レナデックス錠4mg

プレメディケーション: サークリサ投与30分前に

解熱鎮痛薬(カロナール500mg)、抗ヒスタミン薬(レスタミン50mg)

H2受容体拮抗剤(ファモチジンD20mg)、ロイコトリエン受容体拮抗薬(モンテルカスト10mg)
を内服

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
サークリサ	●							●※						
ポマリスト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
デキサート or レナデックス	●							●						

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
●							●※						
●	●	●	●	●	●	●							
●							●						

※2コース目以降のサークリサは day1、15のみ投与

◎必ず 0.2 または 0.22 ミクロンのフィルターを用いて投与すること

	本管	側管
30分	生理食塩液 100mL	デキサート33mg (75歳以上は16.5mg) 生理食塩液 100mL
30分		
		サークリサ10mg/kg 生理食塩液 250mL

カロナール500mg 1錠 内服
 レスタミンコーワ10mg 5錠 内服
 ファモチジンD20mg 1錠 内服
 モンテルカスト10mg 1錠 内服

※全量250mLに調製
※投与速度はサークリサ
点滴速度換算表参照

注)初回投与、2回目以降投与では点滴速度が異なっている
(それぞれ点滴速度換算表で確認すること ※点滴速度換算表は別紙参照)

【サークリサ短縮投与】

※サークリサ2回目以降に infusion reaction が見られない場合に限り2コース目から変更可

	本管	側管
30分	生理食塩液 100mL	デキサート33mg (75歳以上は16.5mg) 生理食塩液 100mL
		サークリサ10mg/kg 生理食塩液 250mL

カロナール500mg 1錠 内服
 レスタミンコーワ10mg 5錠 内服
 ファモチジンD20mg 1錠 内服
 モンテルカスト10mg 1錠 内服

※全量250mLに調製
※投与速度はサークリサ
点滴速度換算表参照