

外科65 FOLFIRI+RAM

☆適応疾患名: 結腸直腸がん

1クール

薬剤	標準投与量	投与経路	投与スケジュール	
			1week	2week
サイラムザ (RAM)	8mg/kg	点滴静注	day1	
レボホリナート (-LV)	200mg/m ²	点滴静注	day1	
フルオロウラシル (5-FU)	2400mg/m ²	持続静注	day1,2	
フルオロウラシル (5-FU)	400mg/m ²	静注(全開)	day1	
イリノテカン (CPT-11)	150mg/m ²	点滴静注	day1	

休薬期間

サイラムザ(ラムシルマブ): サイラムザ点滴静注液100mg, 500mg
 レボホリナート(レボホリナート): レボホリナート点滴静注用25mg, 100mg「ヤクルト」
 フルオロウラシル(フルオロウラシル): フルオロウラシル 250mg, 1000mg
 イリノテカン(イリノテカン塩酸塩): イリノテカン塩酸塩点滴静注液「タイホウ」40mg, 100mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
サイラムザ	●													
レボホリナート	●													
フルオロウラシル<持続静注>	●	●												
フルオロウラシル<全開>	●													
イリノテカン	●													

