

外科66 AC followed by DTX+ハーセプチン(tri-weekly)

☆適応疾患名:乳がん術後補助化学療法

← 1クール →

		投与スケジュール						
薬剤	標準投与量	投与法	1week	2week	3week	4week	5week	6week
エンドキサン(CPA)	600mg/m ²	点滴静注	day1			day22		
ドキソビシン(DXR)	60mg/m ²	静脈注射	day1			day22		

← 休薬期間 →

		投与スケジュール					
投与法		7week	8week	9week	10week	11week	12week
点滴静注	day43				day64		
静脈注射	day43				day64		

AC療法4クール終了後

		投与スケジュール						
薬剤	標準投与量	投与法	1week	2week	3week	4week	5week	6week
ハーセプチン (HER)	《初回》 8mg/kg 《2回目以降》 6mg/kg	点滴静注	day1			day22		
ドセタキセル(DTX)	75mg/m ²	点滴静注	day1			day22		

	7week	8week	9week	10week	11week	12week
day43				day64		
day43				day64		

エンドキサン(シクロホスファミド) : エンドキサン 100mg, 500mg
 ドキソビシン(ドキソルビシン) : ドキソルビシン塩酸塩注 10mg, 50mg
 ハーセプチン(トラスツマブ) : ハーセプチン注射用150mg
 ドセタキセル(ドセタキセル) : ドセタキセル注 20mg, 80mg

初回投与前は必ず心エコーを行い、心機能を評価すること
 初回投与時は入院にて行うこと
 初回投与時はハーセプチンとドセタキセルを同日に投与しないことが望ましい

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
エンドキサン	●																				
ドキソルビシン	●																				
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	●																				
	●																				
	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
	●																				
	●																				
	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
	●																				
	●																				

AC療法4クール終了後

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ハーセプチン	●																				
ドセタキセル	●																				
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
ハーセプチン	●																				
ドセタキセル	●																				
	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
ハーセプチン	●																				
ドセタキセル	●																				
	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
ハーセプチン	●																				
ドセタキセル	●																				

【AC療法 day1.22.43.64】

	ルートキープ用 生食 100mL 使用可
全開	グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL デキサート注射液6.6mg 2V
30分	ルートキープ用 生食 100mL
全開	ドキシソルビシン 60mg/m ² 生理食塩液 50mL
60分	エンドキサン 600mg/m ² 生理食塩液 500mL

【DTX+ハーセプチン day1.22.43.64】

	ルートキープ用 生食 100mL 使用可
90分	ハーセプチン 《初回》8mg/kg 《2回目以降》6mg/kg 生理食塩液 250mL (添付の生理食塩液)
全開	グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL デキサート注射液 6.6mg 1V
30分	ルートキープ用 生食 100mL
60分	ドセタキセル 75mg/m ² 生理食塩液 250mL

《注意》
・初回はモニター装着