

外科67 カドサイラ

☆適応疾患名:乳がん


| 薬剤 | 標準投与量 | 投与法 | 投与スケジュール | | |
|------------------|----------|------|----------|-------|-------|
| | | | 1week | 2week | 3week |
| カドサイラ (T-DM1) | 3.6mg/kg | 点滴静注 | day1 | | |

カドサイラ(トラスツズマブ エムタンシン): カドサイラ点滴静注用100, 160mg

※投与対象:IHC法でHER2(3+), もしくはIHC法でHER2(2+) FISH法でHER2(+)

| | day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| カドサイラ | ● | | | | | | | | | | | | | |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | |



※注意※ 0.2 又は 0.22 μ m インラインフィルター(ポリエーテルスルホン製又はポリスルホン製)を通して投与すること。
 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。
 初回投与前は必ず心エコーを行い心機能を評価すること。
 初回はモニター装着。