

血液内科67 ポライビー＋R-B療法

☆適応疾患名：非ホジキンリンパ腫

【1コース目】			投与スケジュール		
薬剤	標準投与量	投与法	1week	2week	3week
ポライビー	1.8mg/kg	点滴	day1	/	/
リツキシマブ (RIT)	375mg/m ²	点滴	day2	/	/
トレアキシシ	90mg/m ²	点滴	day3, 4	/	/

【2～6コース目】※6コースまで投与可能

ポライビー	1.8mg/kg	点滴	day1	/	/
リツキシマブ (RIT)	375mg/m ²	点滴	day1	/	/
トレアキシシ	90mg/m ²	点滴	day2, 3	/	/

ポライビー(ポラツズマブ ベドチン)：ポライビ一点滴静注用30mg, 140mg
 リツキシマブ (リツキシマブ)：リツキシマブBS点滴静注100mg, 500mg
 トレアキシシ(ベンダムスチン)：トレアキシシ点滴静注液100mg

【1コース目】

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ポライビー	●													
リツキシマブ		●												
トレアキシシ			●	●										

15	16	17	18	19	20	21

【2～6コース目】

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ポライビー	●													
リツキシマブ	●													
トレアキシシ		●	●											

15	16	17	18	19	20	21

【1日目】

	本管	側管
30分	生理食塩液 100mL	
90分※		ポライビー1.8mg/kg 生理食塩液 100mL (注射用水で溶解)

ロキソプロフェン錠 1T } 内服
ポララミン錠 1T }

希釈後の濃度は0.72~2.7mg/mL

※初回投与時に忍容性が良好
⇒30分まで短縮可能

◎0.2または0.22 μmのインラインフィルター使用

【1日目】(1コース目のみ2日目)

	本管	側管
30分	生理食塩液 100mL	
1時間		リツキシマブ375mg/m ² 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度25ml/h)
1時間		(投与速度100ml/h)
最後まで		(投与速度200ml/h)

ロキソプロフェン錠 1T } 内服
ポララミン錠 1T }

【1日目（リツキシマブ2回目以降は下記に変更可能）】

	本管	側管
30分	生理食塩液 100mL	
30分		リツキシマブ375mg/m ² 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度100mL/h)
30分		(投与速度200mL/h)
30分		(投与速度300mL/h)
最後まで		(投与速度400mL/h)

ロキソプロフェン錠 1T } 内服
 ポララミン錠 1T }

※リツキシマブ初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合に変更可能

【2日目・3日目】（1コース目のみ3日目・4日目）

	ルートキープ用 生食100mL 使用可
全開	グラニセトロン点滴静注液3mg 100mL デキサート注射液6.6mg 1V
60分	トレアキシシ 90mg/m ² 生理食塩液 250mL

注1) 最終投与量は 250mL に調製

注2) 調製後室温保存で6時間以内、2~8℃で24時間以内に投与を終了すること