

血液内科70 VR-CAP

☆適応疾患名: 非ホジキンリンパ腫
(マントル細胞リンパ腫)

薬剤	標準投与量	投与法	投与スケジュール		
			1week	2week	3week
リツキシマブ (RIT)	375mg/m ²	点滴	day1		
エンドキサン (CPA)	750mg/m ²	点滴	day2		
ドキシソルビシン (DXR)	50mg/m ²	点滴	day2		
ベルケイド (BOR)	1.3mg/m ²	皮下注射	day2, 5	day9, 12	
プレドニン (PSL)	100mg/body	内服	day2-6		

← 1コース →

← 休薬期間 →

リツキシマブ(リツキシマブ): リツキシマブ100mg, 500mg
 エンドキサン(シクロホスファミド): エンドキサン100mg, 500mg
 ドキシソルビシン(ドキシソルビシン): ドキシソルビシン10mg, ドキシソルビシン50mg
 ベルケイド(ボルテゾミブ): ベルケイド3mg
 プレドニン(プレドニゾロン): プレドニン錠5mg

プレメディケーション: リツキシマブ投与30分前に解熱鎮痛薬(ロキソプロフェン等), 抗ヒスタミン薬(ポララミン等)を内服

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
リツキシマブ	●													
エンドキサン		●												
ドキシソルビシン		●												
ベルケイド		●			●				●			●		
プレドニン		●	●	●	●	●								

15	16	17	18	19	20	21

【1日目 リツキシマブ初回】

	本管	側管	
30分	生理食塩液 100mL		ロキソプロフェン錠 1T } 内服 ポラミン錠 1T
1時間		リツキシマブ375mg/m ² 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度25ml/h)	
1時間		(投与速度100ml/h)	
最後まで		(投与速度200ml/h)	


【1日目 (リツキシマブ2回目以降は下記に変更可能)】

	本管	側管	
30分	生理食塩液 100mL		ロキソプロフェン錠 1T } 内服 ポラミン錠 1T
30分		リツキシマブ375mg/m ² 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度100mL/h)	
30分		(投与速度200mL/h)	
30分		(投与速度300mL/h)	
最後まで		(投与速度400mL/h)	

※リツキシマブ初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合に変更可能


【2日目】

	本管	
↑ 1時間	エンドキサン 750mg/m ² 生理食塩液 500mL <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">カイトリル 1T内服</div>	ドキソルビシン 50mg/m ² 5%ブドウ糖液 100mL
↑ 1時間		



※生理食塩液 1.5mL で溶解し必要量を抜き取る

【5、9、12日目】



※生理食塩液 1.5mL で溶解し必要量を抜き取る