


## 血液内科77 R-COP+RIT weekly

☆適応疾患名：非ホジキンリンパ腫



			投与スケジュール			
薬剤	標準投与量	投与方法	1week	2week	3week	4week
リツキシマブ (RIT)	375mg/m <sup>2</sup>	点滴	day1	day8	day15	day22
エンドキサン (CPA)	750mg/m <sup>2</sup>	点滴	day2	/	/	/
オンコビン (VCR)	1.4mg/m <sup>2</sup>	静注	day2	/	/	/
プレドニン (PSL)	100mg/body	内服	day2-6	/	/	/

リツキシマブ(リツキシマブ)：リツキシマブ100mg, 500mg  
 エンドキサン(シクロホスファミド)：エンドキサン100mg, 500mg  
 オンコビン(ビンクリスチン)：オンコビン1mg  
 プレドニン(プレドニゾロン)：プレドニン錠5mg

プレメディケーション：リツキシマブ投与30分前に解熱鎮痛薬(ロキソプロフェン等)，  
 抗ヒスタミン薬(ポララミン等)を内服  
 エンドキサン使用日はカイトリル錠を併用

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
リツキシマブ	●							●						
エンドキサン		●												
オンコビン		●												
プレドニン		●	●	●	●	●								

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
●							●						

**【1、8、15、22日目】**

	本管	側管
30分	生理食塩液 100mL	
1時間		リツキシマブ375mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度25ml/h)
1時間		(投与速度100ml/h)
最後まで		(投与速度200ml/h)

ロキソプロフェン錠 1T  
 ポララミン錠 1T

} 内服

**【1、8、15、22日目（リツキシマブ2回目以降は下記に変更可能）】**

※リツキシマブ初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合に変更可能

	本管	側管
30分	生理食塩液 100mL	
30分		リツキシマブ375mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度100mL/h)
30分		(投与速度200mL/h)
30分		(投与速度300mL/h)
最後まで		(投与速度400mL/h)

ロキソプロフェン錠 1T  
 ポララミン錠 1T

} 内服

【2日目】

