

血液内科80 Pola+R-CHP療法

☆適応疾患名: 非ホジキンリンパ腫

			1コース		
			投与スケジュール		
薬剤	標準投与量	投与法	1week	2week	3week
リツキシマブ (RIT)	375mg/m ²	点滴	day1	/	/
ポライビー (Pola)	1.8mg/kg	点滴	day2	/	/
エンドキサン (CPA)	750mg/m ²	点滴	day2	/	/
ドキシソルビシン (DXR)	50mg/m ²	点滴	day2	/	/
プレドニン (PSL)	100mg/body	内服	day2-6	/	/

← 休薬期間 →

リツキシマブ (リツキシマブ) : リツキシマブ100mg, 500mg
 ポライビー (ポラツズマブ ベドチン) : ポライビー30mg、140mg
 エンドキサン (シクロホスファミド) : エンドキサン100mg, 500mg
 ドキシソルビシン (ドキシソルビシン) : ドキシソルビシン10mg, 50mg
 プレドニン (プレドニゾロン) : プレドニン錠5mg

プレメディケーション: リツキシマブ, ポライビー投与30分前に解熱鎮痛薬(ロキソプロフェン等), 抗ヒスタミン薬(ポララミン等)を内服

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
リツキシマブ	●													
ポライビー		●												
エンドキサン		●												
ドキシソルビシン		●												
プレドニン		●	●	●	●	●								

15	16	17	18	19	20	21

< 1 コース目 >

【 1 日目 (リツキシマブ初回)】

	本管	側管	
30分	生理食塩液 100mL		ロキソプロフェン錠 1T } 内服 ポラミン錠 1T
1時間		リツキシマブ 375mg/m ² 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度25ml/h)	
1時間		(投与速度100ml/h)	
最後まで		(投与速度200ml/h)	

【 2 日目】

90分		ポライビー 1.8mg/kg 生理食塩液 100mL (注射用水で溶解)	ポライビー 希釈後の濃度は0.72~2.7mg/mL ◎0.2または0.22μmの インラインフィルター使用
30分	経過観察		
30分	ドキソルビシン 50mg/m ² 5%ブドウ糖液 100mL		
2時間	エンドキサン 750mg/m ² 生理食塩液 500mL カイトリル 1T内服		

< 2コース目以降 >

【1日目】

※リツキシマブ初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合に変更可能

	本管	側管	
30分	生理食塩液 100mL		ロキソプロフェン錠 1T } 内服 ポララミン錠 1T
30分		リツキシマブ 375mg/m ² 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度 100ml/h)	
30分		(投与速度 200ml/h)	
30分		(投与速度 300ml/h)	
最後まで		(投与速度 400ml/h)	

【2日目】

	本管	側管	
30分	生理食塩液 100mL		ロキソプロフェン錠 1T } 内服 ポララミン錠 1T
90分※		ポライビー 1.8mg/kg 生理食塩液 100mL (注射用水で溶解)	
30分	経過観察		
30分	ドキソビシン 50mg/m ² 5%ブドウ糖液 100mL		ポライビー 希釈後の濃度は0.72~2.7mg/mL ◎0.2または0.22μmのインラインフィルター使用 ※初回投与時に忍容性が良好 ⇒30分まで短縮可能
2時間	エドキシサン 750mg/m ² 生理食塩液 500mL カイトリル 1T内服		