

血液内科83 BV+AVD

☆適応疾患名:ホジキンリンパ腫



| 薬剤 | 標準投与量 | 投与方法 | 投与スケジュール | | | |
|----------------|------------------------------|------|----------|-------|-------|-------|
| | | | 1week | 2week | 3week | 4week |
| ドキシソルビシン (DXR) | 25mg/m ² | 点滴静注 | day1 | / | day15 | / |
| エクザール (VLB) | 6mg/m ² (MAX10mg) | 点滴静注 | day1 | / | day15 | / |
| ダカルバジン (DTIC) | 375mg/m ² | 点滴静注 | day1 | / | day15 | / |
| アドセトリス | 1.2mg/kg | 点滴静注 | day1 | / | day15 | / |

ドキシソルビシン(ドキシソルビシン):ドキシソルビシン10mg, 50mg
 エクザール(ビンブラスチン):エクザール注射用10mg
 ダカルバジン(ダカルバジン):ダカルバジン注用100mg
 アドセトリス(ブレンツキシマブ ベドチン):アドセトリス点滴静注用50mg

プレメディケーション:アドセトリス投与30分前に解熱鎮痛薬(ロキソプロフェン等),
 抗ヒスタミン薬(ポララミン等)を内服

| | day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| ドキシソルビシン | ● | | | | | | | | | | | | | |
| エクザール | ● | | | | | | | | | | | | | |
| ダカルバジン | ● | | | | | | | | | | | | | |
| アドセトリス | ● | | | | | | | | | | | | | |

| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | ● | | | | | | | | | | | | | |

【1、15日目】

| | |
|-----|---|
| | ルートキープ用 生食 100mL 使用可 |
| 全開 | グラニセトロン点滴静注液3mg100mL デキサート注射液6.6mg 1V |
| 30分 | ドキシソルビシン 25mg/m ² 生理食塩液 100mL |
| 全開 | エクザール 6mg/m ² 生理食塩液 50mL |
| 1時間 | ダカルバジン 375mg/m ² 5%糖液 100mL |
| | 生食でフラッシュ |
| 30分 | アドセトリス 1.2mg/kg 注射用水20mL 生理食塩液 100mL |
| | 生食でフラッシュ |

アプレピタント
ドキシソルビシンを始める
1時間～1時間半前に服用。
Day2、3/Day16、17は午前中に服用
(Day2とDay3、Day16とDay17は同じ時間)

ロキソプロフェン錠 1T } 内服
ポララミン錠 1T }
※アドセトリス30分前

ダカルバジン
◎遮光にして投与
(点滴バッグ、ルートすべて遮光)

アドセトリス
◎1バイアルあたり注射用水10.5mLで
希釈して5mg/mLとする
◎40mg未満の場合は生理食塩液50mL
で溶解する
◎体重100kgを超える場合は
100kgとして計算する

Day3、17 ジーラスタ皮下注3.6mg

or

Day3、17以降
WBC回復まで フィルグラスチム注75μg