


血液内科84 BV+THP-VD

☆適応疾患名:ホジキンリンパ腫



薬剤	標準投与量	投与方法	投与スケジュール			
			1week	2week	3week	4week
ピノルビン (THP)	25mg/m ²	点滴静注	day1		day15	
エクザール (VLB)	6mg/m ² (MAX10mg)	点滴静注	day1		day15	
ダカルバジン (DTIC)	375mg/m ²	点滴静注	day1		day15	
アドセトリス	1.2mg/kg	点滴静注	day1		day15	

ピノルビン(ピノルビン):ピノルビン10mg, 30mg
 エクザール(ビンブラスチン):エクザール注射用10mg
 ダカルバジン(ダカルバジン):ダカルバジン注用100mg
 アドセトリス(ブレンツキシマブ ベドチン):アドセトリス点滴静注用50mg

プレメディケーション:アドセトリス投与30分前に解熱鎮痛薬(ロキソプロフェン等),
 抗ヒスタミン薬(レスタミン等)を内服

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ピノルビン	●													
エクザール	●													
ダカルバジン	●													
アドセトリス	●													

	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	●													
	●													
	●													
	●													

【1、15日目】

全開	ルートキープ用 生食 100mL 使用可 グラニセトン点滴静注液3mg100mL デキサート注射液6.6mg 1V
30分	ピノルビン 25mg/m ² 5%糖液 100mL
全開	エクザール 6mg/m ² 生理食塩液 50mL
1時間	ダカルバジン 375mg/m ² 5%糖液 100mL
	生食でフラッシュ
30分	アドセトリス 1.2mg/kg 注射用水20mL 生理食塩液 100mL
	生食でフラッシュ

アプレピタント
ピノルビンを始める
1時間～1時間半前に服用。
Day2、3/Day16、17は午前中に服用
(Day2とDay3、Day16とDay17は同じ時間)

側管
5%糖液 500mL

ロキソプロフェン錠 1T } 内服
レスタミン錠 5T }
※アドセトリス30分前

ダカルバジン
◎遮光にして投与

アドセトリス
◎1バイアルあたり注射用水
10.5mLで
希釈して5mg/mLとする
◎40mg未満の場合は生理食塩
液50mL
で溶解する
◎体重100kgを超える場合は
100kgとして計算する

Day3、17	ジーラスタ皮下注3.6mg
or	
Day3、17以降 WBC回復まで	フィルグラスチム注75μg