

血液内科87 アドセトリス単剤

☆適応疾患名:ホジキンリンパ腫、末梢性T細胞リンパ腫

			← 1コース →		
			投与スケジュール		
薬剤	標準投与量	投与方法	1week	2week	3week
アドセトリス	1.8mg/kg	点滴	day1	/	/
			← 休薬期間 →		

アドセトリス (ブレンツマブ ベドチン): アドセトリス50mg

プレメディケーション: アドセトリス投与30分前に解熱鎮痛薬(ロキソプロフェン等), 抗ヒスタミン薬(ポララミン等)を内服

< 1コース目 >

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
アドセトリス	●													

15	16	17	18	19	20	21

【 1日目 】

全開	ルートキープ用 生食100mL 使用可	←	ロキソプロフェン錠 1T ポララミン錠 1T ※アドセトリス30分前 } 内服
	デキサート 6.6mg/body 生理食塩液 100mL		
	生食フラッシュ		
30分	アドセトリス 1.8mg/kg 注射用水 20mL 生理食塩液 100mL		アドセトリス ◎1バイアルあたり注射用水10.5mLで希釈して5mg/mLとする ◎40mg未満の場合は生理食塩液50mLで溶解する ◎体重100kgを超える場合は100kgとして計算する
	生食フラッシュ		