


血液内科89 KRd変法(K:36mg/m²,Rなし)

☆適応疾患名:多発性骨髄腫
1コース



薬剤	標準投与量	投与法	投与スケジュール		投与スケジュール	
			1week	2week	3week	4week
カイプロリス	36mg/m ²	点滴静注	day1, 2		day15, 16	
デキサート	16.5mg/body	点滴静注	day1, 2		day15, 16	

カイプロリス(カルフィルゾミブ):カイプロリス点滴静注用10mg, 40mg
【血管外漏出時の組織侵襲:炎症性薬剤】
デキサート(デキサメタゾン):デキサート注射液6.6mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
カイプロリス	●	●												
デキサート	●	●												
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	●	●												
	●	●												

	本管	側管
	5%ブドウ糖液100mL (ルート確保)	
全開		デキサート 16.5mg/body 5%ブドウ糖液 100mL
		5%糖液でフラッシュ
30分		カイプロリス 36mg/m ² 5%ブドウ糖液 50mL

注)カイプロリスの溶解は5%ブドウ糖液または注射用水を使用する
Cl⁻イオンを含む輸液との配合不可