


血液内科91 BDR

☆適応疾患名: 原発性マクログロブリン血症
1コース



薬剤	標準投与量	投与方法	投与スケジュール		
			1week	2week	3week
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下注射	day1, 4	day8, 11	
デキサート	33mg/body	点滴静注 or 内服	day1, 4	day8, 11	
リツキシマブ	375mg/m ²	点滴静注		day11	

ボルテゾミブ(ボルテゾミブ): ボルテゾミブ2mg、3mg
 デキサート(デキサメタゾン): デキサート注射液6.6mg
 リツキシマブ(リツキシマブ): リツキシマブ点滴静注100mg、500mg

プレメディケーション: リツキシマブ投与30分前に解熱鎮痛薬(ロキソプロフェン等), 抗ヒスタミン薬(ポララミン等)を内服

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ボルテゾミブ	●			●				●			●			
デキサート	●			●				●			●			
リツキシマブ											●			

	15	16	17	18	19	20	21

【1、4、8日目】


	本管	側管
	生理食塩液 100mL (ルート確保)	
↑ 30分 ↓		デキサート33mg 生理食塩液 100mL



※ボルテゾミブ 2mg は生理食塩液 1mL、
 ボルテゾミブ 3mg は生理食塩液 1.5mL で溶解し必要量を抜き取る

【11 日目】

	本管	側管
 30分	生理食塩液 100mL (ルート確保)	デキサート33mg 生理食塩液 100mL



※ボルテゾミブ 2mg は生理食塩液 1mL、
 ボルテゾミブ 3mg は生理食塩液 1.5mL で溶解し必要量を抜き取る

	本管	側管
 30分	生理食塩液 100mL	
 1時間		リツキシマブ375mg/m² 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度25ml/h)
 1時間		(投与速度100ml/h)
 最後まで		(投与速度200ml/h)

ロキソプロフェン錠 1T } 内服
 ポララミン錠 1T }

【11日目（リツキシマブ2回目以降は下記に変更可能）】

	本管	側管
30分	生理食塩液 100mL	
30分		リツキシマブ375mg/m ² 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度100mL/h)
30分		(投与速度200mL/h)
30分		(投与速度300mL/h)
最後まで		(投与速度400mL/h)

ロキソプロフェン錠 1T } 内服
 ポラミン錠 1T }

※リツキシマブ初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合に変更可能