

血液内科94 DCyBorD

☆適応疾患名: 全身性ALアミロイドーシス

1コース

【1~2コース】

薬剤	標準投与量	投与方法	投与スケジュール			
			1week	2week	3week	4week
ダラキューロ	1800mg/body	皮下注射	day1	day8	day15	day22
エンドキサン	300mg/m ²	内服	day1	day8	day15	day22
ベルケイド	1.3mg/m ²	皮下投与	day1	day8	day15	day22
レナデックス	※20mg/body	内服	day1,2	day8,9	day15,16	day22,23

※ダラキューロ投与日はレナデックスはダラキューロ投与60分前に内服

【3~6コース】

薬剤	標準投与量	投与方法	投与スケジュール			
			1week	2week	3week	4week
ダラキューロ	1800mg/body	皮下注射	day1		day15	
エンドキサン	300mg/m ²	内服	day1	day8	day15	day22
ベルケイド	1.3mg/m ²	皮下投与	day1	day8	day15	day22
レナデックス	※20mg/body	内服	day1,2	day8,9	day15,16	day22,23

※ダラキューロ投与日はレナデックスはダラキューロ投与60分前に内服

【7コース以降】

薬剤	標準投与量	投与方法	投与スケジュール			
			1week	2week	3week	4week
ダラキューロ	1800mg/body	皮下注射	day1			
レナデックス	※20mg/body	内服	day1			

※ダラキューロ投与日はレナデックスはダラキューロ投与60分前に内服

・70歳を超える、過少体重(BMI: 18.5kg/m²未満)、血液量増加症、コントロール不良の糖尿病、又はステロイド療法に対する忍容性がない若しくは有害事象を発現した患者ではデキサメタゾン20mg/週投与も可能

ダラキューロ(ダラツムマブ): ダラキューロ配合皮下注

【血管外漏出時の組織侵襲: 不明(壊死性ではない)】

※7時間以内に投与終了、遮光・冷所で24時間保管可能

エンドキサン(シクロホスファミド): エンドキサン錠50mg(最大絶対週間投与量:500mg)

ベルケイド(ボルテゾミブ): ベルケイド注射用3mg

レナデックス(デキサメタゾン): レナデックス錠4mg

プレメディケーション: ダラキューロ投与60分前にカロナル500mg 1錠、
レスタミン10mg 5錠を内服 1コース目day1のみ、モンテルカスト10mg 1錠内服

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ダラキューロ	●							●						
エンドキサン	●							●						
ベルケイド	●							●						
レナデックス	●	●						●	●					

	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ダラキューロ	●							●						
エンドキサン	●							●						
ベルケイド	●							●						
レナデックス	●	●						●	●					

3コース目以降ダラキューロはd1,15のみ


7コース目以降ダラキューロはd1のみ

エンドキサン、ベルケイドは7コース以降省略

【1-2コース目及び3-6コース目 day1.15】


ダラキューロ投与 60分前にカロナール 500 mg 1錠、レスタミン 10 mg 5錠、
レナデックス錠 4 mg 5錠内服
(1コース目 day1のみモンテルカスト 10 mg 1錠内服)

ダラキューロ 1800 mg 15mL



5分間かけて皮下注射


エンドキサン錠 300 mg/m²



ダラキューロ投与後
内服

ベルケイド 1.3mg/m²

生理食塩液 20mL 1A




エンドキサン錠内服後
皮下注射

【3-6コース目 day8.22】

レナデックス錠 4mg 5錠内服


エンドキサン錠 300 mg/m²



内服

ベルケイド 1.3mg/m²

生理食塩液 20mL 1A




エンドキサン内服後
皮下注射

【7コース目以降】

ダラキューロ投与 60分前にカロナール 500 mg 1錠、レスタミン 10 mg 5錠、
レナデックス錠 4 mg 5錠内服

ダラキューロ 1800 mg 15mL



5分間かけて皮下注射

参考文献

A Randomized Phase 3 Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Daratumumab in Combination with Cyclophosphamide, Bortezomib and Dexamethasone (CyBorD) Compared With CyBorD Alone in Newly Diagnosed Systemic AL Amyloidosis