
血液内科25 R-B療法

☆適応疾患名: 非ホジキンリンパ腫



リツキシマブ (リツキシマブ): リツキシマブ100mg, 500mg ベンダムスチン(ベンダムスチン): ベンダムスチン25mg,100mg

プレメディケーション:リツキシマブ投与30分前に解熱鎮痛薬(ロキソプロフェン等), 抗ヒスタミン薬(レスタミン等)を内服

※低悪性度非ホジキンリンパ腫の場合は90mg/m²,4週間毎

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
リツキシマブ														
ベンダムスチン														

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
											ļ		
								[[[Γ	[[<u>-</u>

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
リツキシマブ														
ベンダムスチン														

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
											l		
							T				[

H22.12.21 作成

H25.9.13 改訂

R4.7.6 改訂

R4.7.13 改訂

R6.7.18 改訂 R7.8.21 改訂

【1日目】

本管	側管	 ロキソプロ	フェン錠	1Τ\	-t- 017
生理食塩液 100mL		ロキソプロフレスタミン		5T	内服
	リツキシマブ375mg/m² 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度25ml/h)				
	(投与速度100ml/h)				
	(投与速度200ml/h)				

【1日目(リツキシマブ2回目以降は下記に変更可能)】

		本管	側管	(□キソプロフェン錠 1寸 内服
4	30分	生理食塩液 100mL		レスタミン 5T 内服
3	30分		リツキシマブ375mg/m² 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度100mL/h)	
7	30分		(投与速度200mL/h)	
7	30分		(投与速度300mL/h)	
7	最後まで		(投与速度400mL/h)	

※リツキシマブ初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合に変更可能

H22.12.21 作成 H25.9.13 改訂 R4.7.6 改訂 R4.7.13 改訂 R6.7.18 改訂 R7.8.21 改訂

【2日目】

	ルートキープ用 生食100mL 使用可
全開	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 1袋 デキサート注射液6.6mg 1V
10分	ベンダムスチン 120mg/m² 生理食塩液 50mL

※調製後室温では 6 時間、2-8℃保存の場合 24 時間以内に投与を終了すること

【3日目】

		ルートキープ用 生食100mL 使用可
全開		生理食塩液100mL デキサート注射液6.6mg 1V
10分	,	ベンダムスチン 120mg/m² 生理食塩液 50mL

※調製後室温では 6 時間、2-8℃保存の場合 24 時間以内に投与を終了すること

<外来では下記に変更可能>

【1日目】

		本管	側管] / ロキソプロフェン錠 1Tl 中間
1	,30分	生理食塩液 100m L		〜── ロキソプロフェン錠 1T 内服 レスタミン 57 内服
3	30分		リツキシマブ375mg/m² 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度100mL/h)	
1	30分		(投与速度200mL/h)	
3	30分		(投与速度300mL/h)	
7	最後まで		(投与速度400mL/h)	
	全開		パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 1袋 デキサート注射液6.6mg 1V	
7	10分		ベンダムスチン 120mg/m ² 生理食塩液 50mL	

※リツキシマブ初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合に変更可能

【2日目】

	ルートキープ用 生食100mL 使用可
全開	生理食塩液100mL デキサート注射液6.6mg 1V
10分	インダムスチン 120mg/m ² 生理食塩液 50mL

※調製後室温では6時間、2-8℃保存の場合24時間以内に投与を終了すること

H22.12.21 作成 H25.9.13 改訂 R4.7.6 改訂 R4.7.13 改訂 R6.7.18 改訂 R7.8.21 改訂