

血液内科67 ポライビー＋R-B療法

☆適応疾患名：非ホジキンリンパ腫

			1コース		
【1コース目】			投与スケジュール		
薬剤	標準投与量	投与法	1week	2week	3week
リツキシマブ (RIT)	375mg/m ²	点滴	day1		
ポライビー	1.8mg/kg	点滴	day2		
ベンダムスチン	90mg/m ²	点滴	day2,3		

【2～6コース目】※6コースまで投与可能

リツキシマブ (RIT)	375mg/m ²	点滴	day1		
ポライビー	1.8mg/kg	点滴	day1		
ベンダムスチン	90mg/m ²	点滴	day1, 2		

← 休薬期間 →

リツキシマブ (リツキシマブ)：リツキシマブBS点滴静注100mg, 500mg
 ポライビー (ポラツズマブ ベドチン)：ポライビー点滴静注用30mg, 140mg
 ベンダムスチン (ベンダムスチン)：ベンダムスチン点滴静注液25mg, 100mg

【1コース目】

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
リツキシマブ	●													
ポライビー		●												
ベンダムスチン		●	●											

15	16	17	18	19	20	21

【2～6コース目】

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
リツキシマブ	●													
ポライビー	●													
ベンダムスチン	●	●												

15	16	17	18	19	20	21

R3.6.4 作成
 R4.5.17 改訂
 R6.7.18 改訂
 R7.8.21 改訂

<1コース目>

【1日目】

	本管	側管	
30分	生理食塩液 100mL		ロキソプロフェン錠 1T } 内服 レスタミン錠 5T
1時間		リツキシマブ375mg/m ² 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度25ml/h)	
1時間		(投与速度100ml/h)	
最後まで		(投与速度200ml/h)	

【2日目】

	本管	側管	
30分	生理食塩液 100mL		ロキソプロフェン錠 1T } 内服 レスタミン錠 5T
90分		ポライビー1.8mg/kg 生理食塩液 100mL (注射用水で溶解)	ポライビー 希釈後の濃度は0.72～2.7mg/mL ◎0.2または0.22μmのインラインフィルター使用
30分	経過観察		
全開		パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL デキサート注射液6.6mg 1V	ベンダムスチン 調製後室温保存で6時間以内、 2～8℃で24時間以内に投与を終了すること
10分		ベンダムスチン90mg/m ² 生理食塩液 50mL	

R3.6.4 作成
R4.5.17 改訂
R6.7.18 改訂
R7.8.21 改訂

【3日目】

	ルートキープ用 生食100mL 使用可
全開	生理食塩液 100mL デキサート注射液6.6mg 1V
10分	ベンダムスチン 90mg/m ² 生理食塩液 50mL

◎調製後室温保存で6時間以内、2～8℃で24時間以内に投与を終了すること

R3.6.4 作成
R4.5.17 改訂
R6.7.18 改訂
R7.8.21 改訂

< 2 コース目以降 >

【1日目】

※リツキシマブ初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合に変更可能

	本管	側管	
30分	生理食塩液 100mL		ロキソプロフェン錠 1T } 内服 レスタミン錠 5T
30分		リツキシマブ375mg/m ² 5%ブドウ糖液 500mL (投与速度100mL/h)	
30分		(投与速度200mL/h)	
30分		(投与速度300mL/h)	
最後まで		(投与速度400mL/h)	ロキソプロフェン錠 1T } 内服 レスタミン錠 5T ※省略可能
30分	経過観察		
90分※		ポライビー1.8mg/kg 生理食塩液 100mL (注射用水で溶解)	
30分	経過観察		
全開		パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL デキサート注射液6.6mg 1V	
10分		ベンダムスチン 90mg/m ² 生理食塩液 50mL	

ポライビー

希釈後の濃度は0.72～2.7mg/mL

◎0.2または0.22μmのインラインフィルター使用

※初回投与時に忍容性が良好

⇒30分まで短縮可能

ベンダムスチン

調製後室温保存で6時間以内、

2～8℃で24時間以内に投与を終了すること

R3.6.4 作成

R4.5.17 改訂

R6.7.18 改訂

R7.8.21 改訂

【2日目】

	ルートキープ用 生食100mL 使用可
全開	生理食塩液 100mL デキサート注射液6.6mg 1V
10分	ベンダムスチン 90mg/m ² 生理食塩液 50mL

◎調製後室温保存で 6 時間以内、2～8℃で 24 時間以内に投与を終了すること

R3.6.4 作成
R4.5.17 改訂
R6.7.18 改訂
R7.8.21 改訂