

外科 フェスゴ

☆適応疾患名:乳がん

※HER2陽性乳がんに対して術前にフェスゴ＋化学療法を実施したのちの術後薬物療法として実施(14コースまで)

			1クール		
			投与スケジュール		
薬剤	標準投与量	投与法	1week	2week	3week
フェスゴ (Pertuzumab/ Trastuzumab/hyaluronidase-zzxf)	《初回》IN(1200mg.600mg.30000U) 《2回目以降》MA(600mg.600mg.20000U)	皮下注	day1		
※前回の投与日から6週間以上のときには、初回投与量(フェスゴIN)を投与する。 ※前回の投与日から6週間未満のときには、維持投与量(フェスゴMA)を投与する。			休薬期間		



*投与対象:IHC法でHER2(3+),もしくはIHC法でHER2(2+),FISH法でHER2(+)

初回投与前は必ず心エコーを行い、心機能を評価すること
初回投与時は入院にて行うこと

フェスゴ(ペルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ) : フェスゴ配合皮下注MA,IN

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
フェスゴ	●													

15	16	17	18	19	20	21



参考文献

Fixed-dose combination of pertuzumab and trastuzumab for subcutaneous injection plus chemotherapy in HER2-positive early breast cancer (FeDeriCa): a randomised, open-label, multicentre, non-inferiority, phase 3 study Lancet Oncol 2021 Jan;22(1):85-97