

外科74 オプジーボ+SOX

☆適応疾患名: 胃がん

			1クール		
			投与スケジュール		
薬剤	標準投与量	投与経路	1week	2week	3week
オプジーボ	360mg/body	点滴静注	day1		
オキサリプラチン (L-OHP)	100mg/m ²	点滴静注	day1		
エスワン (S1)	80~120mg/body	1日2回内服	day1~day14		

オプジーボ(ニボルマブ): オプジーボ 120mg, 240mg
 オキサリプラチン(オキサリプラチン): オキサリプラチン50mg, 100mg
 エスワン(テガフル, ギメラシル, オテラシルカリウム): エスワン 20mg, 25mg

← 休薬期間 →

体表面積	エスワン(1日量)
1.25m ² 未満	80mg/body
1.25m ² 以上~1.5m ² 未満	100mg/body
1.5m ² 以上	120mg/body

30<Ccr≤60:原則として1段階以上の減量(30~40未満は2段階減量が望ましい)
 Ccr≤30:投与不可

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オプジーボ	●													
オキサリプラチン	●													
エスワン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

15	16	17	18	19	20	21

ルートキープ用 生食 100mL 使用可	
30分	オプジーボ 360mg 生理食塩液 100mL
全開	パロノセトロン点滴静注バック 0.75mg/50mL 1袋 デキサート注射液6.6mg 1V
30分	ルートキープ用 生食 100mL
2時間	オキサリプラチン 100mg/m ² 5%ブドウ糖注 500mL
	エスワンは夕食後から内服開始

※オプジーボはインラインフィルター(0.22μm以下)を使用

参考文献: Nivolumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy in patients with HER2-negative, untreated, unresectable advanced or recurrent gastric or gastro-oesophageal junction cancer (ATTRACTION-4): a randomised, multicentre, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial N Engl J Med. 2021 Mar 4;384(9):829–841