

外科75 キイトルーダ+PTX+CBDCA

☆適応疾患名:乳がん

※トリプルネガティブ乳がん術前薬物療法として、4コース実施

1コース

			投与スケジュール		
薬剤	標準投与量	投与法	1week	2week	3week
キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	day1		
パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	day1	day8	day15
カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	day1		

キイトルーダ(ペムブロリズマブ): キイトルーダ 200mg

パクリタキセル(パクリタキセル): パクリタキセル 100mg.30mg

カルボプラチン(カルボプラチン): カルボプラチン 150mg

<参考> CBDCA投与量(mg/body)=目標AUC値×(GFR+25) [Calvertの式]

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
キイトルーダ	●													
パクリタキセル	●							●						
カルボプラチン	●													

	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ							
パクリタキセル	●						
カルボプラチン							

【1日目】

	ルートキープ用 生食 100mL 使用可
30分	キイトルーダ 200mg 生理食塩液 100mL
5分	ルートキープ用 生食 100mL (フラッシュ)
全開	グラニセトロン点滴静注 100mL 1袋 デキサート注射液 6.6mg 1.5V ファモチジン注射液 20mg 1A ポララミン注5mg 1A
30分	ルートキープ用 生食 100mL
60分	パクリタキセル 80mg/m ² 生理食塩液 250mL
60分	カルボプラチン AUC:5 生理食塩液 250mL

キイトルーダ・パクリタキセル
※インラインフィルター(0.2-0.22 μm)を使用

《注意》
・初回はモニター装着
・初めの10分間はゆっくり投与

【8.15日目】

	ルートキープ用 生食100mL 使用可
全開	生理食塩液 100mL デキサート注射液 6.6mg 1V ファモチジン注射液 20mg 1A
30分	ルートキープ用 生食100mL
60分	パクリタキセル注 80mg/m ² 生理食塩液 250mL

パクリタキセル
※インラインフィルター(0.22 μm 以下)を使用

デキサート
患者の状態次第で3.3mgまで減量可能

《注意》
・初回はモニター装着
・始めの10分はゆっくり投与

参考文献:Pembrolizumab for Early Triple-Negative Breast Cancer *N Engl J Med* 2020; 382: 810-821