

外科76 キイトルーダ+EC

☆適応疾患名:乳がん

※トリプルネガティブ乳がん術前薬物療法として、キイトルーダ+PTX+CBDC4コース実施 後に4コース

1クール

			投与スケジュール		
薬剤	標準投与量	投与法	1week	2week	3week
キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	day1		
エンドキサン (CPA)	600mg/m ²	点滴静注	day1		
塩酸エピルビシン (EPI)	90mg/m ²	静脈注射	day1		

休薬期間

キイトルーダ(ペムブロリズマブ): キイトルーダ 200mg

エンドキサン(シクロホスファミド): エンドキサン 100mg, 500mg

塩酸エピルビシン(エピルビシン): 塩酸エピルビシン注10mg「メルク」

前投薬: 塩酸エピルビシンの1.5-1時間前にアプレピタント125mg服用、day2,3にアプレピタント80mg服用

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
キイトルーダ	●													
エンドキサン	●													
塩酸エピルビシン	●													

15	16	17	18	19	20	21

	ルートキープ用 生食 100mL 使用可
30分	キイトルーダ 200mg 生理食塩液 100mL
5分	ルートキープ用生食 100mL
全開	パロノセトロン点滴静注バック0.75mg/50mL デキサート注射液6.6mg 1.5V
30分	ルートキープ用 生食 100mL
全開	塩酸エピルビシン注90mg/m ² 生理食塩液 50mL
30分	エンドキサン 600mg/m ² 生理食塩液 250mL

キイトルーダ
※インラインフィルター(0.2-5 μm)を使用

参考文献:Pembrolizumab for Early Triple-Negative Breast Cancer N Engl J Med 2020; 382: 810-821