

## 外科77 キイトルーダ

☆適応疾患名:乳がん

※トリプルネガティブ乳がんに対して術前にキイトルーダ＋化学療法を実施したのちの術後薬物療法として実施(9コースまで)

|        |            |      | 1コース     |       |       |
|--------|------------|------|----------|-------|-------|
|        |            |      | 投与スケジュール |       |       |
| 薬剤     | 標準投与量      | 投与法  | 1week    | 2week | 3week |
| キイトルーダ | 200mg/body | 点滴静注 | day1     |       |       |
|        |            |      | 休薬期間     |       |       |

キイトルーダ(ペムブロリズマブ): キイトルーダ 200mg

|        | day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| キイトルーダ | ●    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |    |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
|     | ルートキープ用 生食 100mL 使用可        |
| 30分 | キイトルーダ 200mg<br>生理食塩液 100mL |
| 5分  | ルートキープ用 生食 100mL(フラッシュ)     |

※インラインフィルター(0.2-5  $\mu$ m)を使用

参考文献:Pembrolizumab for Early Triple-Negative Breast Cancer N Engl J Med 2020; 382: 810-821