

血液内科95 エルレフィオ

☆適応疾患名: 多発性骨髄腫

1コース

【1コース】			投与スケジュール			
薬剤	標準投与量	投与方法	1week		2week	
エルレフィオ	12mg	皮下注	day1			
	32mg	皮下注		day4		
	76mg	皮下注			day8	

【2-23コース目】			投与スケジュール	
薬剤	標準投与量	投与方法	1week	
エルレフィオ	76mg	皮下注	day1	

【24コース以降】			投与スケジュール	
薬剤	標準投与量	投与方法	1week	2week
エルレフィオ	76mg	皮下注	day1	

※36コース目以降は76mgを4週間間隔での投与も可能

エルレフィオ(エルラナタマブ): エルレフィオ皮下注44mg, 76mg

調製後は速やかに使用。直ちに使用しない場合は2-30℃で保管し4時間以内に使用

CRS(サイトカイン放出症候群)を軽減させるための薬剤投与

1-3回目: エルレフィオ投与60分前にカロナール錠500mg、レスタミンコーワ錠10mg3錠、デカドロン 錠4mg5錠を内服

休薬・中止基準; 好中球 500 / μ L 未満、発熱性好中球減少症出現時(好中球 1000/ μ L 以上に回復するまで)、ヘモグロビン値 8g/dL 未満、血小板 25,000 /mm³ 未満、血小板が 25,000/ μ L ~ 50,000/ μ L の間で出血がある場合(出血が治まるまで)、CRS(サイトカイン放出症候群)、ICANS(免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群)、TLS(腫瘍崩壊症候群) 出現時

【1コース目】

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
エルレフィオ	●			●				●						


【2-23コース目】

	day1	2	3	4	5	6	7
エルレフィオ	●						


【24コース目以降】

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
エルレフィオ	●													


【初回投与】エルレフィオ 12mg



【2回目投与】エルレフィオ 32mg



【3回目投与以降】エルレフィオ 76mg



参考文献

Elranatamab in relapsed or refractory multiple myeloma: phase 2 MagnetisMM-3 trial results Nat Med2023 Sep;29(9):2259-2267