

# 外科29 CAPOX+BV

☆適応疾患名:結腸直腸がん

薬剤	標準投与量	投与経路	1クール		
			投与スケジュール		
			1week	2week	3week
アバスチン (BV)	7.5mg/kg	点滴静注	day1		
オキサリプラチン(L-OHP)	130mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1		
カペシタビン (Cap)	1200~2100mg/回	内服	day1~day14		

休薬期間

アバスチン(ベバシズマブ):アバスチン点滴静注用100mg, 400mg  
 オキサリプラチン(オキサリプラチン):オキサリプラチン点滴静注液50mg,100mg  
 カペシタビン(カペシタビン):カペシタビン錠 300mg

体表面積	投与量(1日量)
1.36m <sup>2</sup> 未満	2400mg
1.36m <sup>2</sup> 以上1.66m <sup>2</sup> 未満	3000mg
1.66m <sup>2</sup> 以上1.96m <sup>2</sup> 未満	3600mg
1.96m <sup>2</sup> 以上	4200mg

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
アバスチン	●													
オキサリプラチン	●													
カペシタビン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

15	16	17	18	19	20	21

	ルートキープ用 生食 100mL
全開	パロノセトロン点滴静注バッグ 50mL デキサート注射液6.6mg 1V
90分※	アバスチン 7.5mg/kg 生理食塩液 100mL
5分	ルートキープ用 生食 100mL
2時間	オキサリプラチン 130mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖注 500mL
	カペシタビンは夕食後から内服開始

H21.11.10 作成  
 H25.3.4 改訂  
 H26.6.6 改訂  
 H27.6.5 改訂  
 R8.5.21 改訂