

外科78 オプジーボ+ヤーボイ

☆適応疾患名: 悪性黒色腫

← 1クール →

【1-4コース】			投与スケジュール		
薬剤	標準投与量	投与方法	1week	2week	3week
オプジーボ	80mg	点滴静注	day1	/	/
ヤーボイ	3mg/kg	点滴静注	day1		

← 休薬期間 1クール →

【5コース目以降】			投与スケジュール	
薬剤	標準投与量	投与方法	1week	2week
オプジーボ	240mg	点滴静注	day1	/

もしくは

← 1クール →

【1-4コース】			投与スケジュール			
薬剤	標準投与量	投与方法	1week	2week	3week	4week
オプジーボ	480mg	点滴静注	day1	/	/	/

オプジーボ(ニボルマブ): オプジーボ 20mg,240mg
 ヤーボイ(イピリムマブ): ヤーボイ20mg,50mg

【1-4コース】

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オプジーボ	●													
ヤーボイ	●													

	15	16	17	18	19	20	21
オプジーボ							
ヤーボイ							

【5コース目以降】

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オプジーボ240mg	●													

または、

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オプジーボ480mg	●													

	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

【1-4 コース】

	ルートキープ用 生食 100mL 使用可
30分	オブジーボ80mg/body ※ 生理食塩液 100mL
30分	ルートキープ用 生食 100mL
30分	ヤーボイ 3mg/kg ※ 生理食塩液 100mL
5分	ルートキープ用 生食 100mL(フラッシュ)

※

オブジーボ

インラインフィルター(0.2 or 0.22 μ m)を使用

注)体重 30kg 未満の患者は全量 100mL 以下となるように調製

ヤーボイ

1~4mg/mL の濃度に希釈し、インラインフィルター(0.2-1.2 μ m)を使用

【5 コース目以降】

	ルートキープ用 生食 100mL 使用可
30分	オブジーボ 240mg or 480mg/body ※ 生理食塩液 100mL
5分	ルートキープ用 生食 100mL(フラッシュ)

※インラインフィルター(0.2 or 0.22 μ m)を使用

注)体重 30kg 未満の患者は全量 100mL 以下となるように調製

参考文献: Combined Nivolumab and Ipilimumab or Monotherapy in Untreated Melanoma :N Engl J Med. 2015 Jul 2;373(1):23-34.doi: 10.1056/NEJMoa1504030. Epub 2015 May 31