

消化器内科17 ビロイ+CAPOX

☆適応疾患名: 胃がん

| 薬剤 | 標準投与量 | 投与経路 | 投与スケジュール | | |
|-----------------------|---|------|------------|-------|-------|
| | | | 1week | 2week | 3week |
| ビロイ | ≪初回≫ 800mg/m ² ≪2回目以降≫ 600mg/m ² | 点滴静注 | day1 | | |
| オキサリプラチン (L-OHP) | 130mg/m ² | 点滴静注 | day1 | | |
| カペシタビン (Capecitabine) | 1200~2100mg/回 | 内服 | day1~day14 | | |

1クール

休薬期間

ビロイ(ゾルベツキシマブ): ビロイ点滴静注用100mg, 300mg
 オキサリプラチン: オキサリプラチン点滴静注液 50mg, 100mg
 カペシタビン: カペシタビン錠 300mg

| 体表面積 | カペシタビン投与量(日) |
|--|--------------|
| 1.36m ² 未満 | 2,400mg |
| 1.36m ² 以上1.66m ² 未満 | 3,000mg |
| 1.66m ² 以上1.96m ² 未満 | 3,600mg |
| 1.96m ² 以上 | 4,200mg |

前投薬としてビロイ投与の1-1.5時間前にアプレピタント125mg内服、day2,3午前中にアプレピタント各80mg内服

| | day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| ビロイ | ● | | | | | | | | | | | | | |
| オキサリプラチン | ● | | | | | | | | | | | | | |
| カペシタビン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ビロイ投与速度表

≪初回(800mg/m²)≫

| 投与速度 | | | | 50mg/m ² /h投与時 |
|--------|---------|----------|---------|---------------------------|
| 開始~60分 | 60~120分 | 120~180分 | 180分~ | |
| 70mL/h | 140mL/h | 210mL/h | 280mL/h | 35mL/h |

≪2回目以降(600mg/m²)≫

| 投与速度 | | | | 35mg/m ² /h投与時 |
|----------|--------|---------|---------|---------------------------|
| 開始~60分 ※ | 60~90分 | 90~120分 | 120分~ | |
| 35mL/h | 70mL/h | 105mL/h | 140mL/h | 17mL/h |

【1コース目】

| | |
|-----|---|
| | ルートキープ用 生食 100mL 使用可 |
| 全開 | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL デキサート注射液6.6mg 1.5V ポララミン注 1A |
| | ビロイ 800mg/m ² 注射用水(100mgあたり5mLで溶解) 生理食塩液 500mL |
| 2時間 | オキサリプラチン 130mg/m ² 5%ブドウ糖注 250mL |
| | カペシタビンは夕食後から内服開始 |

・ビロイ投与 1.5-1 時間前にアプレピタント 125 mgを投与

・ビロイ：孔径 0.2μm のインラインフィルターの使用を推奨

嘔気発現時には「ビロイ投与中の嘔気発現時の対応」をもとに対処

【2 コース目以降】

| | |
|-----|---|
| | ルートキープ用 生食 100mL 使用可 |
| 全開 | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL デキサート注射液6.6mg 1.5V ポララミン注 1A |
| | ビロイ 600mg/m ² 注射用水(100mgあたり5mLで溶解) 生理食塩液 250mL |
| 2時間 | オキサリプラチン 130mg/m ² 5%ブドウ糖注 250mL |
| | カペシタビンは夕食後から内服開始 |

・ビロイ投与 1.5-1 時間前にアプレピタント 125 mgを投与

・ビロイ：孔径 0.2μm のインラインフィルターの使用を推奨

嘔気発現時には「ビロイ投与中の嘔気発現時の対応」をもとに対処

参考文献：Zolbetuximab plus CAPOX in CLDN18.2-positive gastric or gastroesophageal junction adenocarcinoma: the randomized, phase 3 GLOW trial Nat Med2023 Aug;29(8):2133-2141