

# 血液内科44 DBd

☆適応疾患名：多発性骨髄腫

← 1コース →

【1～3コース】			投与スケジュール		
薬剤	標準投与量	投与方法	1week	2week	3week
ダラキューロ	1800mg/body	皮下投与	day1	day8	day15
ボルテゾミブ	1.3mg/m <sup>2</sup>	皮下投与	day1, 4	day8,11	
レナデックス	※20mg/body	内服	day1,2,4,5	day8,9,11,12	day15,16

【4～8コース】			投与スケジュール		
薬剤	標準投与量	投与方法	1week	2week	3week
ダラキューロ	1800mg/body	皮下投与	day1		
ボルテゾミブ	1.3mg/m <sup>2</sup>	皮下投与	day1, 4	day8,11	
レナデックス	※20mg/body	内服(朝食後)	day1,2,4,5	day8,9,11,12	

【9コース以降】			投与スケジュール		
薬剤	標準投与量	投与方法	1week	2week	3week
ダラキューロ	1800mg/body	皮下投与	day1		
ボルテゾミブ	1.3mg/m <sup>2</sup>	皮下投与			
レナデックス	※20mg/body	内服(朝食後)	day1,2		

・75歳を超える、過少体重(BMI:18.5kg/m<sup>2</sup>未満)、コントロール不良の糖尿病、又はステロイド療法に対する忍容性がない若しくは有害事象を発現した患者には、デキサメタゾンを20mg/週で投与することを可とした。

ダラキューロ(ダラツムマブ)：ダラキューロ

【血管外漏出時の組織侵襲：不明(壊死性ではない)】

※調整後室温で7時間、遮光・冷所で24時間保管可能

ボルテゾミブ(ボルテゾミブ)：ボルテゾミブ ※8時間安定

レナデックス(デキサメタゾン)：レナデックス錠4mg

プレメディケーション：ダラキューロ投与60分前にカロナール500mg 1錠、レスタミン10mg 5錠、モンテルカスト10mg 1錠、レナデックス20mgを内服

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ダラキューロ	●							●						
ボルテゾミブ	●			●				●			●			
レナデックス	●	●		●	●			●	●		●	●		

15	16	17	18	19	20	21	
●							4コース以降、ダラキューロはday1のみ
							ボルテゾミブは9コース以降省略
●	●						レナデックス9コース以降はday1,2のみ

【ダラキューロ・ボルテゾミブ投与時】


ダラキューロ投与 60 分前にカロナール 500 mg 1 錠、レスタミン 10 mg 5 錠、  
モンテルカスト 10 mg 1 錠、レナデックス錠 4 mg 5 錠内服

ダラキューロ 1800 mg      15mL



5 分間かけて皮下注射

ボルテゾミブ      1.3mg/m<sup>2</sup>  
生理食塩液 20mL      1A




ダラキューロ終了後  
皮下注射

※ボルテゾミブ 2mg は生理食塩液 1mL、  
ボルテゾミブ 3mg は生理食塩液 1.5mL で溶解し必要量を抜き取る

【ダラキューロのみ投与時】

ダラキューロ投与 60 分前にカロナール 500 mg 1 錠、レスタミン 10 mg 5 錠、  
モンテルカスト 10 mg 1 錠、レナデックス錠 4 mg 5 錠内服


ダラキューロ 1800 mg      15mL



5 分間かけて皮下注射

【ボルテゾミブのみ投与時】

ボルテゾミブ      1.3mg/m<sup>2</sup>  
生理食塩液 20mL      1A



皮下注射

※ボルテゾミブ 2mg は生理食塩液 1mL、  
ボルテゾミブ 3mg は生理食塩液 1.5mL で溶解し必要量を抜き取る

