

# 血液内科45 DLd

☆適応疾患名: 多発性骨髄腫

1コース

## 【1, 2コース】

薬剤	標準投与量	投与方法	投与スケジュール			
			1week	2week	3week	4week
ダラキューロ	1800mg/body	皮下投与	day1	day8	day15	day22
レブラミド	25mg/body	内服(寝る前)	day1~21			
レナデックス	※20mg/body	内服	day1,2	day8,9	day15,16	day22,23

## 【3~6コース】

薬剤	標準投与量	投与方法	投与スケジュール			
			1week	2week	3week	4week
ダラキューロ	1800mg/body	皮下投与	day1		day15	
レブラミド	25mg/body	内服(寝る前)	day1~21			
レナデックス	※20mg/body	内服	day1,2	day8,9	day15,16	day22,23

## 【7コース以降】

薬剤	標準投与量	投与方法	投与スケジュール			
			1week	2week	3week	4week
ダラキューロ	1800mg/body	皮下投与	day1			
レブラミド	25mg/body	内服(寝る前)	day1~21			
レナデックス	※20mg/body	内服	day1,2	day8,9	day15,16	day22,23

※・70歳を超える又は過少体重(BMI: 18.5kg/m<sup>2</sup>未満)患者に対してはレナデックス20mg/週投与も可能

ダラキューロ(ダラツムマブ): ダラキューロ

【血管外漏出時の組織侵襲: 不明(壊死性ではない)】

※調整後室温で7時間、遮光・冷所で24時間保管可能

レブラミド(レナリドミド): レナリドミドカプセル5mg, レブラミドカプセル5mg

レナデックス(デキサメタゾン): レナデックス錠4mg

プレメディケーション: ダラキューロ投与60分前にカロナール500mg 1錠、  
レスタミン10mg 5錠、モンテルカスト10mg 1錠を内服


	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ダラキューロ	●							●※						
レブラミド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
レナデックス	●	●						●	●					

	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	●※							●※						
	●	●	●	●	●	●	●							
	●	●						●	●					

※3~6コースはダラキューロの day8, 22を省略、7コース以降はday15も省略

ダラキュー口投与 60 分前にカロナール 500 mg 1 錠、レスタミン 10 mg 5 錠、  
モンテルカスト 10 mg 1 錠、レナデックス錠 4 mg 5 錠内服

ダラキュー口 1800 mg      15mL



5 分間かけて皮下注射