


血液内科68 DKd

☆適応疾患名:多発性骨髄腫

1コース



【1コース目】

薬剤	標準投与量	投与法	投与スケジュール			
			1week	2week	3week	4week
ダラキューロ	1800mg/bod	皮下投与	day1	day8	day15	day22
カイプロリス	20mg/m ² 56mg/m ²	点滴静注 点滴静注	day1, 2	day8, 9	day15, 16	
デキサート	33mg/week	点滴静注	day1, 2	day8, 9	day15, 16	day22

【2コース目】

薬剤	標準投与量	投与法	投与スケジュール			
			1week	2week	3week	4week
ダラキューロ	1800mg/bod	皮下投与	day1	day8	day15	day22
カイプロリス	56mg/m ²	点滴静注	day1, 2	day8, 9	day15, 16	
デキサート	33mg/week	点滴静注	day1, 2	day8, 9	day15, 16	day22

【3~6コース目】

	標準投与量	投与法	投与スケジュール			
			1week	2week	3week	4week
ダラキューロ	1800mg/bod	皮下投与	day1		day15	
カイプロリス	56mg/m ²	点滴静注	day1, 2	day8, 9	day15, 16	
デキサート	33mg/week	点滴静注	day1, 2	day8, 9	day15, 16	
レナデックス	40mg/week	内服				day22

【7コース目以降】

	標準投与量	投与法	投与スケジュール			
			1week	2week	3week	4week
ダラキューロ	1800mg/bod	皮下投与	day1			
カイプロリス	56mg/m ²	点滴静注	day1, 2	day8, 9	day15, 16	
デキサート	33mg/week	点滴静注	day1, 2	day8, 9	day15, 16	
レナデックス	40mg/week	内服				day22

ダラキューロ(ダラツムマブ):ダラキューロ

カイプロリス(カルフィルゾミブ):カイプロリス点滴静注用10mg, 40mg

デキサート(デキサメタゾン):デキサート注射液6.6mg

レナデックス(デキサメタゾン):レナデックス錠4mg

プレメディケーション:ダラキューロ投与60分前にカロナール500mg 1錠、
レスタミン10mg 5錠、モンテルカスト10mg 1錠を内服

	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ダラキューロ	●							●※						
カiproリス	●	●						●	●					
レナデックス or デキサート	●	●						●	●					
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	●※							●※						
	●	●												
	●	●						●						

※3~6 コース目はダラザレックスの d8, 22 を省略、7
コース目以降は d15 も省略


◎必ずポリエーテルスルホン製の 0.2 ミクロンのインラインフィルターを用いて投与すること

ダラキューロ、カiproリス投与

【1コース目 day1】

	本管	側管	
30分	5%ブドウ糖液100mL (ルートキープ)	デキサート16.5mg	← カロナール500mg 1錠 レスタミン10mg 5錠 内
		5%ブドウ糖液100mL	
10分		5%ブドウ糖液でフラッシュ	
		カiproリス 20mg/m ²	
		5%ブドウ糖液 50mL	
		5%ブドウ糖液でフラッシュ	


注)カiproリスの溶解は5%ブドウ糖液または
注射用水を使用する
Cl⁻イオンを含む輸液との配合不可



カiproリス投与終了後

ダラキューロ 1800 mg 15mL

※前投薬投与 60 分後



5 分間かけて皮下注射

【1コース目 day8 以降】

	本管	側管	
30分	5%ブドウ糖液100mL (ルートキープ)	デキサート16.5mg	← カロナール500mg 1錠 レスタミン10mg 5錠 内
		5%ブドウ糖液100mL	
10分		5%ブドウ糖液でフラッシュ	
		カイプロリス 56mg/m ²	
		5%ブドウ糖液 50mL	

5%ブドウ糖液でフラッシュ
 注)カイプロリスの溶解は5%ブドウ糖液または
 注射用水を使用する
 Cl⁻イオンを含む輸液との配合不可

↓ カイプロリス投与終了後

ダラキューロ 1800 mg 15mL

5分間かけて皮下注射

※前投薬投与 60 分後

カイプロリスのみ投与

	本管	側管
30分	5%ブドウ糖液100mL (ルートキープ)	デキサート16.5mg
		5%ブドウ糖液100mL
10分		5%ブドウ糖液でフラッシュ
		カイプロリス 56mg/m ²
		5%ブドウ糖液 50mL

5%ブドウ糖液でフラッシュ
 注)カイプロリスの溶解は5%ブドウ糖液または
 注射用水を使用する
 Cl⁻イオンを含む輸液との配合不可

ダラキューロのみ投与

ダラキューロ投与 60 分前にカロナール 500 mg 1 錠、レスタミン 10 mg 5 錠、
 モンテルカスト 10 mg 1 錠、レナデックス錠 4 mg 10 錠内服

ダラキューロ 1800 mg 15mL

5分間かけて皮下注射